

Przygotowanie do gastroskopii

Przed badaniem należy zastosować się do następujących zaleceń:

1. **Jeżeli badanie planowane jest w godzinach porannych:** należy pozostać na czczo i nie zażywać porannych leków.
2. **Jeżeli badanie ma odbyć się w godzinach popołudniowych lub wieczornych:** wymagany jest minimum **6** - godzinny okres powstrzymywania się od posiłku. Dozwolone jest wówczas lekkostrawne śniadanie (można przyjąć poranne leki) oraz przyjmowanie płynów do **3** godzin przed badaniem.
3. **Po konsultacji z lekarzem** kierującym na badanie należy:
 - na **14** dni przed badaniem odstawić leki na żołądek (**chodzi głównie o leki z grupy inhibitorów pompy protonowej IPP mające w składzie prazol**).
 - preparaty, które wpływają na krzepliwość krwi, odstawić na **7** dni przed planowaną gastroskopią, lekarz rozważy ewentualną zamianę na inne leki.
4. Pacjenci chorzy na cukrzycę powinni zgłosić ten fakt w rejestracji, gdyż przed gastroskopią niezbędne jest odstawienie leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny. W takim przypadku badanie zostanie wykonane w godzinach porannych, aby cukrzycy mogli po nim spożyć lekkie śniadanie oraz przyjąć potrzebne leki.
5. Na czas badania należy wyjąć z ust ruchome protezy zębowe!
6. Prosimy zabrać ze sobą na badanie dokument potwierdzający tożsamość, okulary do czytania (celem wypełnienia dokumentów) i **wyniki poprzednich tego typu badań** o ile takowe były.