

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII Z ZASTOSOWANIEM PREPARATU FORTTRANS

Szanowni Państwo, w trosce o prawidłowe przygotowanie jelita grubego do badania, prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zastosowanie się do zaleceń. **W celu przygotowania jelita grubego do badania należy zastosować preparat Fortrans**, wykupiony na receptę wystawioną przez lekarza kierującego na badanie.

Postępowanie:

1. **Na 10 dni przed badaniem:** nie należy spożywać pieczywa z ziarnami, musli, maku, buraczków, kaszy, kapusty, szpinaku, pomidorów, owoców z pestkami (np.: truskawek, winogron, jagód)
2. **Dwa dni przed badaniem:** spożywać tylko kisiel i pić przezroczyste płyny (woda, herbata).
3. **W przeddzień badania, do południa:** rano wypić kisiel. Od tego momentu należy przyjmować tylko przezroczyste płyny: herbata, woda niegazowana.
4. **W przeddzień badania, po południu:** należy zacząć pić Fortrans – lek przeczyszczający.

Dawkowanie Fortransu:

Kobieta < 60 kg, bez zaparć: 4 saszetki Fortransu.

Kobieta < 60 kg, z zaparciami; kobieta i mężczyzna powyżej 60 kg: 6 saszetek Fortransu.

UWAGA!!! Dodatkowo, oprócz Fortransu należy wypić 1-2 litry przezroczystych płynów.

Przygotowanie leku Fortrans: rozpuścić kolejno jedną saszetkę w jednym litrze przegotowanej, letniej wody i stosować według schematu:

Schemat przyjmowania Fortransu w zależności od planowanej godziny badania:

Wariant I	Wariant II	Wariant III	Wariant IV
Badanie w godz. 08.00-10.30	Badanie w godz. 11.00-13.30	Badanie w godz. 14.00-16.00	Badanie w godz. 16.30 -18.00
Dzień poprzedzający badanie:	Dzień poprzedzający badanie:	Dzień poprzedzający badanie:	Dzień poprzedzający badanie:
Saszetka 1 -14.00 *	Saszetka 1 - 14.00 *	Saszetka 1 - 15.00 *	Saszetka 1- 16.00
2 -16.00	2- 16.00	2 - 17.00	2 - 19.00 *
3 -18.00 *	3 - 18.00 *	3 - 20.00 *	3 - 23.00 *
4 -20.00	4 - 20.00	4 - 23.00	W dzień badania:
5 -21.00 *	5 - 23.00 *	W dzień badania:	Saszetka 4 - 06.00*
6 -23.00 *	W dzień badania:	Saszetka 5 - 07.00 *	5 - 09.00*
	Saszetka 6 - 06.00 *	6 - 10.00 *	6 - 12.00*

*** Dawkowanie oznaczone gwiazdką dla kobiet poniżej 60 kg, bez zaparć (4 dawki).**

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYPIĆ ZALECANĄ ILOŚĆ ROZTWORU FORTTRANSU I PYNÓW. W PRZECIWNYM RAZIE, BADANIE MOŻE OKAZAĆ SIĘ NIEDIAGNOSTYCZNE I LEKARZ MOŻE ODSTĄPIĆ OD BADANIA.

PRZYJMOWANIE PŁYNÓW NALEŻY ZAKOŃCZYĆ 2-3 GODZ. PRZED BADANIEM.

5. **W dniu badania:** rano należy przyjąć leki stosowane na stałe.

6. Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem prowadzącym (diabetologiem, internistą) w celu omówienia sposobu przygotowania się do badania.

7. Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np.: Acenocumarol, Sintrom, Plavix) powinny na 7 dni przed badaniem zamienić je na heparynę drobnocząsteczkową (Fraxiparyna, Cleksane) lub przerwać ich stosowanie; jednak należy to jednak koniecznie skonsultować z lekarzem prowadzącym (kardiologiem, internistą). Przyjmowanie tych leków należy zgłosić lekarzowi wykonującemu kolonoskopię.

8. Na 7 dni przed badaniem należy odstawić preparaty żelaza i niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. Ibuprofen, które mogą zwiększyć zdolność do krwawienia.

ZMIANY W PRZYJMOWANIU LEKÓW ZAWSZE MUSZĄ BYĆ POD KONTROLĄ LEKARZA POWADZĄCEGO / LECZĄCEGO.

9. Prosimy zabrać ze sobą na badanie dokument stwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną, koszulkę na przebranie, papcie, okulary (jeżeli się korzysta).

10. Na badanie należy przyjść bez biżuterii, paznokcie u rąk powinny być bez powłok lakierowanych.

8. Po badaniu pacjenta powinna odebrać bliska osoba.